

Gynaecologie

Adviezen na diagnostische hysteroscopie

Streekziekenhuis
Koningin
Beatrix



U heeft een diagnostische hysteroscopie ondergaan. Het is belangrijk dat u de volgende adviezen opvolgt om de kans op complicaties te verminderen.

- U kunt een gevoelige buik of buikkrampen hebben. Hiervoor mag u Paracetamol gebruiken. Volgt u de bijsluiter in de verpakking.
- U kunt 1 tot 2 weken nog wat vaginaal bloedverlies hebben. Wij adviseren u om maandverband en geen tampons te gebruiken. Wij adviseren om geen bad te nemen, douchen mag wel, Als u geen vaginaal bloedverlies (meer) hebt, mag u geslachtsgemeenschap hebben.
- U mag na 3 tot 5 dagen het werk weer hervatten.
- U mag weer fietsen, autorijden en sporten zodra u denkt, dat u daartoe in staat bent. Luister vooral 'naar uw lichaam'.

Wanneer contact opnemen

Neem contact op met uw huisarts bij de volgende problemen:

- koorts boven 38,5 C
- abnormaal veel bloedverlies
- hevige buikpijn

De dag na de ingreep neemt de verpleegkundige contact met u op om te informeren hoe het met u gaat. Heeft u vragen dan kunt u die natuurlijk stellen aan de verpleegkundige.

Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk

Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
info@skbwinterswijk.nl
www.skbwinterswijk.nl