

Algemeen

Huidtest

Streekziekenhuis
Koningin
Beatrix



Een huidtest toont aan of het lichaam allergisch reageert op bepaalde stoffen. Deze test vindt plaats op de functieafdeling van het ziekenhuis in Winterswijk of de buitenpolikliniek in Eibergen.

Vorbereiding

Als voorbereiding op het onderzoek is het belangrijk dat, wanneer u bepaalde medicijnen gebruikt, u hiermee een aantal dagen van te voren stopt. Informatie hierover staat in de bijlage. Als er iets niet duidelijk is of wanneer stoppen met de medicijnen voor u een probleem is, overlegt u dit dan met de arts. Wilt u tijdens het onderzoek wel aangeven, met welke medicijnen u gestopt bent. In het belang van het onderzoek vragen wij u geen bodylotion of crème op uw onderarmen te gebruiken op de dag van het onderzoek.

Het onderzoek

De functieanaliste plakt plakband met getallen op uw arm. Dan brengt zij één druppel van verschillende allergeenvloeistoffen op uw arm aan. Met kleine naaldjes prikt de assistente door de druppels in uw huid. Na 15 minuten inwerktijd bekijkt zij de arm op eventuele reacties. Als er een bultje of roodheid optreedt, meet zij de grootte van de reactie. Bij jeuk niet krabben; dit kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

Tijdens de afspraak met uw specialist wordt de uitslag besproken.

Verhindert

Mocht u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de secretaresse van de functieafdeling van het ziekenhuis via telefoonnummer: 0543 - 54 46 70. Of als u een afspraak bij de buitenpolikliniek in Eibergen heeft via telefoonnummer 0543 - 54 45 00. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt'. Deze is te vinden op: folders.skbwinterswijk.nl.

BIJLAGE

Onderstaand vind u de medicijnen die van invloed zijn op een allergie test.

Tricyclische antidepressiva: indien u één van onderstaande medicijnen gebruikt, verdient bloedonderzoek voor allergie de voorkeur. Indien toch gekozen wordt voor de huidpriktest: alleen na uitvoerig overleg met de arts.

- Amitriptyline (amitriptyline);
- Anafranil (clomipramine);
- Ludiomil (maprotiline);
- Maprotiline (maprotyline);
- Nortilen (nortriptyline);
- Pertofran (desipramine);
- Prothiaden (dosulepine);
- arotex (amitriptyline);
- Sinequan (doxepine);
- urmontil (trimipramine);
- Tryptizol (amitriptyline).

Antihistaminica: middel tegen allergie of andere aandoeningen, o.a. reistabletten. Indien u één van onderstaande medicijnen gebruikt, stopt u daarmee 3 dagen voor de test.

- Alerius (desloratadine);
- Allerfree (loratadine);
- Atarax (hydroxyzine);
- Cinnipirine (cinnarizine);
- Cinnarizine (cinnarizine);
- Claritine (loratadine);
- Cyclizine (cyclizine);
- Dramamine (dimenhydrinaat);
- Emesafene (meclozine/pyridoxine);
- Hydroxyzine (hydroxyzine);
- Incidal (mebhydroline);
- Fenistil (demetindeen);
- Kestine (ebastine);
- Ketotifen (ketotifen);
- Marzine (cyclizine);

- Mebhydroline (mebhydroline);
- Mizollen (mizolastine);
- Navicalm (hydroxyzine);
- Nedeltran (Alimenazine);
- Periactin (cyproheptadine);
- Phenergan (promethazine);
- Polaramine (dexchlorfeniramine);
- Primatour (cinnarizine);
- Promethazine (promethazine);
- Reactine (cetirizine);
- Revalintabs (cetirizine);
- Rupafin (Rupatadine);
- Semprex (acrivastine);
- Suprimal (meclozine);
- Tavegil (clemastine);
- Telfast (fexofenadine);
- Tinset (oxatomide);
- Triludan/Triludan Forte (terfenadine);
- Xyzal (levocetirizine);
- Zaditen (ketotifen);
- Zyrtec (cetirizine).

Orale corticosteroïden: ontstekingsremmende middelen. Indien u één van onderstaande medicijnen gebruikt, stopt u daarmee een week vóór de test.

- Albicort (triamcinolonacetonide);
- Celestone (betamethason);
- Cortison (cortison);
- Decadron (dexamethason);
- Depo-Medrol (betamethason);
- Dexamethason (dexamethason);
- Di-Adrison (prednisolon);
- Hydro-Adreson (hydrocortison);
- Hydrocortison (hydrocortison);
- Ledercort (triamcinolon);
- Lederspan (triamcinolonhexacetonide);
- Methylprednisolon (methylprednisolon);
- Methylpresol (methylprednisolon);
- Oradexon (dexamethason);
- Prednisolon (prednisolon);
- Prednison (prednison);
- Solu-Cortef (hydrocortison);
- Solu-Medrol (methylprednisolon);
- Triamcinolon (triamcinolon).

Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk

Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

T 0543 54 44 44
info@skbwinterswijk.nl
www.skbwinterswijk.nl