

# Patiënteninformatie

**Reumatologie**

## **Sulfasalazine**

Medicijn bij reumatische aandoening

Streekziekenhuis  
Koningin  
Beatrix



Uw reumatoloog heeft u Sulfasalazine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. In deze folder kunt u lezen over het medicijn Sulfasalazine en waar u op moet letten als u het gebruikt. Lees naast deze folder ook altijd de bijsluiter van de apotheek.

### **Doel van de behandeling**

Sulfasalazine kan de oorzaak van uw reumatische aandoening niet wegnemen. U gebruikt Sulfasalazine om de ontsteking in uw gewrichten te remmen. De zwelling in de gewrichten, stijfheid en pijn nemen dan af. Dit kan de schade aan de gewrichten vertragen of voorkomen. Of het middel bij u goed werkt, merkt u pas als u het ongeveer 6 tot 12 weken gebruikt. Soms duurt het langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

### **Wijze van innemen**

Sulfasalazine is een medicijn in de vorm van tabletten van 500 milligram en wordt meestal volgens een opbouwschema gebruikt.

U kunt tabletten het best innemen met water tijdens de maaltijd. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter de vergeten dosering overslaan. Neem geen dubbele dosis. De volgende dag kunt u de Sulfasalazine weer op de voor u vaste momenten innemen.

### **Controle**

Op het moment dat u begint met het innemen van Sulfasalazine, is het belangrijk dat u uw bloed regelmatig laat nakijken. Dit is om te onderzoeken of uw lever en nieren goed werken en of u genoeg rode en witte bloedlichaampjes in uw bloed heeft. In de beginperiode zal dit vaker zijn dan in een later stadium. De uitslag hiervan is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft hiervoor niet te bellen of langs te komen. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslagen afwijkend zijn.

## **Mogelijke bijwerkingen**

Sommige mensen kunnen in het begin last krijgen van bijwerkingen, die vaak vanzelf overgaan.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- hoofdpijn of duizeligheid
- maag-/darmklachten
- huiduitslag, soms met koorts
- oranjeurine. Dit is onschuldig en gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken
- afwijkende bloedsuitslagen
- erge keelpijn in combinatie met koorts, bloedneuzen en blauwe plekken (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak)
- een verandering van uw stemming

## **Belangrijk**

Neem contact op met uw reumatoloog bij huiduitslag, keelpijn in combinatie met koorts, bloedneuzen en blauwe plekken. Of als één of meerdere bijwerkingen blijven aanhouden.

## **Combinatie met andere medicijnen**

U kunt Sulfasalazine in combinatie met bijna alle medicijnen gebruiken. Er zijn enkele medicijnen die de werking van Sulfasalazine beïnvloeden. De apotheek attendeert u hierop en adviseert u hierin. Informeer daarnaast uw huisarts, specialist en de trombosedienst altijd over welke medicijnen u gebruikt. Belangrijk: als u nieuwe medicijnen gebruikt, meld dit dan aan uw reumatoloog.

## **Combinatie met alcohol**

Als u alcohol drinkt neemt de kans op leverafwijkingen toe. Wees daarom voorzichtig met alcohol en neem bij voorkeur niet meer dan één à twee alcoholconsumpties per dag.

## **Reizen en vaccinaties (inentingen)**

### *Griepvaccinatie*

De griepvaccinatie kunt u veilig via uw huisarts laten toedienen tijdens de behandeling met Sulfasalazine. Het nemen van een griepvaccinatie wordt zelfs aanbevolen.

### *Reisvaccinaties*

Als u naast Sulfasalazine géén andere reumaremmers gebruikt, kunt u reisvaccinaties veilig laten toedienen.

### *Medicijnpaspoort*

Bij de apotheek kunt u een medicijnpaspoort halen. Als u ziek bent tijdens de vakantie kan de arts in het medicijnpaspoort zien welke medicijnen u gebruikt. Ook is het bij de (luchthaven)controle of douane een verantwoording voor de medicijnen die u bij u heeft.

### **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Heeft u een kinderwens of bent u (onverwacht) zwanger, dan is het van belang hierover te overleggen met uw reumatoloog. Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Bij mannen kan het een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken, wat herstelt binnen één tot drie maanden na het stoppen van het middel.

Sulfasalazine mag tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding gebruikt worden tot een dosering van 2 keer per dag 1000 mg (= 2 keer per dag 2 tabletten van 500 mg).

### **Vragen**

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt bellen met de secretaresse van de polikliniek Reumatologie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30- 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 - 54 42 38.

### **Geheimhouding en recht op privacy**

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt'. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: [www.skbwinterswijk.nl](http://www.skbwinterswijk.nl)

Bezoekadres:  
Beatrixpark 1  
7101 BN Winterswijk

Postadres:  
Postbus 9005  
7100 GG Winterswijk

T 0543 54 44 44  
F 0543 52 23 95  
[info@skbwinterswijk.nl](mailto:info@skbwinterswijk.nl)  
[www.skbwinterswijk.nl](http://www.skbwinterswijk.nl)